



## Tunisie Orthopédique

Année 2008, Vol 1, N° 1

pp 98

Accès Libre sur / Free Access on  
www.sotcot.org.tn



### Critique du score IKDC d'évaluation subjective du genou

Ben Hamida F., Zehi K.

*Service de traumatologie - Institut national d'orthopédie M.T. Kassab. La Manouba - Tunisie*

#### Correspondance

Zehi KHEIREDDINE

Institut d'Orthopédie M.T. KASSAB. LA Manouba 2010

E-mail : khzehi@yahoo.fr

Le score IKDC (International Knee Documentation Committee) est l'un des nombreux questionnaires axés sur le patient, mis au point pour évaluer la fonction du genou avant et après traitement. Cette cotation prend en compte huit critères : l'impression subjective du patient, les symptômes (avec notamment le niveau d'activité), la mobilité, la laxité, les signes fémoro-patellaires et fémoro-tibiaux, les anomalies du site de prélèvement, les radiographies et le saut monopodal.

La validité et la fiabilité de ce score ont été prouvées à travers de nombreuses études. Il n'en reste pas moins critiquable et nous avons pu relever à travers nos différents travaux, particulièrement en ce qui concerne la chirurgie de reconstruction du ligament croisé antérieur, certains éléments qui méritent d'être soulignés.

En effet, la chirurgie ligamentaire s'adressant actuellement à une population hétérogène et non plus uniquement aux sportifs, il nous semble donc logique d'évaluer la fonction du genou pour un niveau d'activité qui n'est pas forcément lié à la pratique sportive comme le propose cette classification. Par ailleurs, souvent la reprise du sport n'est pas faite au même niveau pour des raisons non liées à l'accident, qui est vécu parfois par le patient comme le signal d'un changement dans sa vie. Ce facteur, certes difficile à évaluer, n'est pas pris en compte par cette cotation. Enfin, nous trouvons le score IKDC plus sévère, comparé aux autres classifications (ARPEGE, LYSHOLM), car il prend en compte la valeur la plus basse, notée sur l'ensemble des items.

Néanmoins, le score IKDC reste, à l'heure actuelle, le seul à prendre en considération la mesure objective de la laxité antérieure résiduelle dans l'expression du résultat final. En plus, son utilisation par la majorité des auteurs, pour évaluer les résultats de la reconstruction du ligament croisé antérieur, permet d'uniformiser la présentation des résultats publiés et ainsi de les comparer entre eux.